

ACONITUM NAPELLUS

(Sisakvirág)

Az Aconitum elsősorban akut, hirtelen jelentkező tünetek kezelésére használható, azonban néha krónikusan fennálló panaszok, félelmek, szorongás vagy pánik esetén is szóba jöhet. A panaszok általában nagyon intenzíven, hirtelen jelentkeznek. Gyakran használjuk hevesen jelentkező infekciók első stádiumában, vagy erős ijedtséggel, halálfélelemmel járó állapotok kezelésére. Számos esetben megjelenhet az a tünet, hogy a páciens azt mondogatja, hogy „közel a vég, ekkor és ekkor fogok meghalni”.

Leggyakoribb indikációs területek: Angina pectoralis^x, Bronchitis acuta, Krupp, Facialis neuralgia, Felső légúti infekciók első stádiuma, Fogfájás, Influenza, Különböző ritmuszavarok kiegészítő kezelése, Különböző szorongásos eredetű kórképek, Myocardiális infarctus kiegészítő kezelése, Neuralgiás panaszok, Otitis media, Pánikbetegség, Pharyngitis, Stroke, Traumás állapotok kiegészítő kezelése, Vertigo, Vizeletretenció traumát, ijedtséget követően.

Etiológia:

Hirtelen hőmérsékletváltozás (lehülés, hideg szél, száraz, hideg, jeges vízbe esés). Ijedtség, baleset, baleset látványa utáni akut panaszok.

Modalitások:

- **Roszzabbodás:** Hirtelen hideghatásra, hideg száraz szél esetén. Este és éjszaka, éjfél körül. Ágyból való felkeléskor. Bal oldalán vagy a fájdalmas oldalán fekvé.
- **Javulás:** Amint verítékezni kezd, melegben.

Kísérő tünetek:

Száraz bőr, Erős szomjúságérzet, Halálfélelem, Szorongás.

Mentális tünetek:

Az Aconitum mentális képére kifejezett szorongások, erős halálfélelem jellemzők. Tünetei sokszor erős ijedtség, sokk hatására alakulnak ki. Aconitumra gondolhatunk, ha a pánikbetegség kialakulása valamilyen mentális sokkal hozható összefüggésbe. Kulcstünet, hogy a beteg „előre megjósolja halála óráját”. Jellemző lehet a klausztrófia; félelem a zsúfolt helyeken, repülőgépeken, stb. Nem bírja elviselni a zenét. Természeti katasztrófák után kialakult lelki állapotok kezelésének első választandó szere általában.

Szív- és érrendszeri indikációs területek:

Aconitum javasolható minden olyan szív és érrendszeri megbetegedés esetén, mely izgatottsággal, halálfélelemmel jár. Akut alkalmazás esetén a tünetek jelentkezésekor szopogassunk el 5 golyócskát, majd újabb 5 golyócskát oldjunk fel 2 dl vízben, és két óra alatt kortyolgassuk el. Mivel az Aconitum akut szer, a legtöbb esetben ennyi idő alatt vagy megszűnnek a tünetek, vagy más homeopátiás gyógyszer adása szükséges. ^xEz az adagolási forma alkalmazható vérnyomáskiugrás, különböző eredetű szívritmuszavarok, angina pectoralis, myocardiális infarktus esetén is.

Akut lázas állapot esetén:

Aconitum adható minden akut magas lázzal járó betegség kezdetén függetlenül a diagnózistól és az eredettől (etiológia, modalitást mindenképpen vegyük figyelembe). Lázas állapot alatt a bőr nagyon forró és száraz, esetleg megfigyelhető a Chamomillához hasonlóan az egyik arcfél kipirulása, míg a másik sápadt marad. Nyári indikációs terület a napszúrás során történő alkalmazása az Aconitumnak, ilyenkor szintén alkalmazhatjuk a fent leírt adagolási sémát (Apis, Belladonna lehetnek a követő szerek).

Neurológiai indikációs területek:

Bármilyen hirtelen jelentkező neurológiai tünet esetén a kezdeti stádiumban alkalmazhatunk Aconitumot.^x Azaz gondoljunk rá TIA, stroke esetén is. Speciális indikációs terület lehet a különböző eredetű idegfájdalmak megjelenése (pl. trigeminus neuralgia).

Légzőszervek: Nátha kezdeti szakasza, forró váladékkal és testszerte sugárzó fájdalommal. A kruppos köhögés nagyon fontos szere (Spongia, Hepar sulfuris, Phosphorus). Hirtelen kialakuló tüdőgyulladás, kombinálva nagyfokú félelemmel és nehézlégzéssel.

Szemek: Conjunctivitis idegen testtől. (A szemek ARNIKÁJA)

Urogenitális és nőgyógyászati alkalmazások:

Speciális alkalmazási terület a szülés után jelentkező vizeletretenció a kismamánál, illetve az újszülöttnél. Fenyegető abortusz félelemtől, vagy ijedtségtől. Menstruáció kimaradása ijedtségtől. Szintén Aconitumra gondoljunk, ha a szülés alatt az anyuka erős halálfélelemmel küzd. (Őt golyócskát szopogasson el, ajánlott a C30 potencia, és ez ismételhető még 3-szor 20 percenként adagolva.)

Aconitum-gyerekek: Sikít, kiabál ijedtség után. Arcán nagyfokú félelem tükröződik, ide-oda rohangál ijedtében. Fogcsikorgatás. Vizes hasmenés forró nyári napokon, a gyerek nyugtalan, sír, sikoltozik és álmatlan. Fogzáskor jelentkező heves, vizes hasmenés és esetleg görcsök is.

Hasonló szerek: Belladonna, Arsenicum album, Phosphorus, Stramonium, Opium, Bryonia

^xTermészetesen csak a hagyományos terápia kiegészítésére




*Az **Aconitum** az egyik legfontosabb szer elhúzódó, komplikált szülés után a csecsemőknek.*




*Az **Aconitum** tünetei hevesek, gyorsan alakulnak ki, egyik pillanatról a másikra. Az **Aconitum** tüneteit halálfélelem kísérheti, gyakran jó lehet szívtünetek esetében (infarktus, angina, pánikbetegség).*



*Az **Aconitum** a heves tünetei alatt nagyon rosszul tűri az éles hangokat, zajokat.*



*Az **Aconitum** tüneteit gyakran a hideg, száraz idő váltja ki.*



*Az **Aconitum** hirtelen lázasodik be, gyakran éjszaka 24 óra körül, ha lázas, kívánja a hideg vizet.*